



G U Z S E L
P U B L I C I D A D

MERCADOTECNIA · DIRECCIÓN MÉDICA · ARTE



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

MERCADOTECNIA

- Posicionamiento de productos
- Elaboración de slogans y claims promocionales
- Comunicación con clientes
- Ventas
- Administración

DIRECCIÓN MÉDICA




- Búsqueda de información científica
- Traducción de textos
- Elaboración de Copy
- Paquete de referencias subrayadas
- Selección de Líderes de Opinión
- Elaboración de Protocolos Fase IV
- **Capacitación:** Elaboración de Manuales para F de V

ARTE


- Desarrollo de los Conceptos de Campaña
- Diseño de material impreso (*lits., fascículos, diseño editorial, empaque, material POP, etc.*)
- Impresión de materiales
- Diseño web
- Diseño para medios digitales



CONCEPTOS de CAMPAÑA



Portadas para Ayudas Visuales
Varios



Portadas para Ayudas Visuales
Varios




Portadas para Ayudas Visuales
Abbott



Portadas para Ayudas Visuales
ControlLip 160®
Abbott



LITERATURAS



Microdacyn⁶⁰
INNOVACIÓN CERTIFICADA
PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS

SSO

Es una solución de superoxidación (SSO) elaborada con modernas técnicas electroquímicas de alta tecnología¹

**ANTISÉPTICO
ESTERILIZANTE
DESINFECTANTE**

Microdacyn⁶⁰
TRIPLE ACCIÓN

Acción antimicrobiana*

1. Modificacións proteicas
2. Desnaturalización de proteínas
3. Penetración apical
4. Altera las funciones básicas de las microorganismos
5. Cheque osmótico

Resistencia microbiana de CO₂ y O₂

MG

Microdacyn⁶⁰
Solución

INNOVACIÓN CERTIFICADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS

Heridas cutáneas superficiales

Raspones

Cortaduras

Abrasiones

Derma

Microdacyn⁶⁰ Hydrogel

INNOVACIÓN CERTIFICADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS

EN ACNÉ INFLAMATORIO

MECANISMO DE ACCIÓN*

Inhibe la degranulación de las células cebadas

Evita la producción de IL-6

Evita la producción de TNF-α

Disminuye la inflamación

Microdacyn⁶⁰

INNOVACIÓN CERTIFICADA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS

BENEFICIOS¹

- Rápida y eficaz acción antiséptica microbicida de amplio espectro
- Útil para la irrigación, humectación y desbridamiento de las heridas agudas y crónicas, infectadas y difíciles de sanar
- No provoca resistencia bacteriana
- No irrita la piel ni los tejidos
- No mancha

Listo para usarse
No requiere dilución ni activadores

More Pharma

Ayuda Visual para iPad (lanzamiento)
Microdacyn[®] 60
Sanfer



Evite que la neurodegeneración afecte el SNC

PROBIOMED



Sistema Nervioso Del Daño a los Sintomas

Objetivo del tratamiento de la esclerosis múltiple (EM)
 Eliminar las recaídas y retrasar la progresión de la incapacidad.
 El uso de glabramer y el interferón beta la dosis baja o media son las opciones de primera línea para el tratamiento de la EMDEA.
 Ante la falta de alguno de estos 2 tratamientos, se puede buscar el intercambio con la otra opción de primera línea.*

Clave 4365	Clave 5257	Clave SS 5257	Clave 5251
Probioglat	Uribeta	EMaxem	JUMTAB
707	682	117	240



Sistema Nervioso Del Daño a los Sintomas

Tratamientos de Primera Línea

- Terapia SC*
- Disminuye las recaídas^{1,2}
- Efecto inmunomodulador*
- Acción neuroprotectora sobre la mielina^{1,2}

Algoritmo para el uso de inmunomoduladores en la Esclerosis Múltiple*


Tratamientos de Primera Línea

- Terapia SC*
- Disminuye la tasa de recaídas en 30%*
- Retrasa la aparición de eventos posteriores*
- Disminuye las recaídas
- Terapia IM*
- Es de utilidad en EM establecida*
- Indicado en EM desde el primer evento*
- Reduce la tasa de lesiones nuevas en 55%*
- Disminuye la progresión de la incapacidad*

Ayuda Visual
 Probioglat®, Uribeta®, Emaxem® y Jumtab®
 Probiomed



Ayuda Visual
ControlLip 160[®]
Abbott



Resteral® Sertralina

- Un meta-análisis de 26,000 pacientes que evaluó a 12 antidepresivos concluyó que la Sertralina es la mejor opción en depresión por sus beneficios, aceptabilidad y costo¹
- Se recomienda como fármaco de primera elección en el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo²

- Disminuye la severidad y frecuencia de los ataques de pánico protegiendo de recaída hasta por 36 semanas tras la suspensión del fármaco³
- Es eficaz y bien tolerado en el tratamiento de los pacientes con depresión ocasionada por cáncer⁴




Mejoría de la Calidad de Vida en pacientes con depresión tratados con Sertralina⁴



Semana	Calificación	p-valor
Semana 0	4.53	
Semana 4	7.51	p=0.011
Semana 12	7.67	p<0.000

Ayuda Visual
Resteral®
Primus



La hipersensibilidad
es síntoma de
DOLOR NEUROPÁTICO

Nopatic®
Gabapentina

Aprobado por la FDA 1

- Es el fármaco antiepiléptico que cuenta con más evidencias clínicas para el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa 1

Fisiopatología del Dolor Neuropático 2

Hiperalgnesia → **Nopatic®** Gabapentina → Sensibilización central y periférica

Dolor Neuropático:
Neuropatía diabética
Neuralgia post-herpética

- Posee el efecto analgésico más claramente demostrado para el tratamiento del dolor neuropático *
- Indicado en el tratamiento de la neuropatía diabética periférica y la neuralgia post-herpética 3,4
- De primera línea en el tratamiento de diferentes tipos de **dolor neuropático** 5
- Mejora la calidad de vida *
- A diferencia del tramadol, la gabapentina es un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento del dolor neuropático 7
- A diferencia del tramadol, la gabapentina no ocasiona dependencia ni estreñimiento *

Referencias: 1. Saperin DS, et al. Gabapentin administration guidelines for the treatment of neuropathic pain. Clin Ther. 2004;26(10):1468-81. 2. Wiffen B. Gabapentin for the treatment of pain. Neurotherapeutics. 2004;1(1):1-10. 3. Saperin DS, et al. Gabapentin for neuropathic pain. Neurotherapeutics. 2004;1(1):1-10. 4. Saperin DS, et al. Gabapentin for neuropathic pain. Neurotherapeutics. 2004;1(1):1-10. 5. Saperin DS, et al. Gabapentin for neuropathic pain. Neurotherapeutics. 2004;1(1):1-10. 6. Saperin DS, et al. Gabapentin for neuropathic pain. Neurotherapeutics. 2004;1(1):1-10. 7. Saperin DS, et al. Gabapentin for neuropathic pain. Neurotherapeutics. 2004;1(1):1-10.

Ayuda Visual
Nopatic®
Primus



En desequilibrio GI y GU...

Librax®

Ansiolítico + Antiespasmódico

La terapia integral que logra el equilibrio

Generación del Problema¹
Ansiedad, Tensión emocional, Estrés

↓ Clordiazepóxido

SNS → Aparato Digestivo

SNP → Bromuro de clidinio → Aparato Genitourinario

Indicaciones^{2,3}

Aparato digestivo	Aparato genitourinario
Colon irritable	Vejiga irritable
Gastritis	Enuresis
Úlcera péptica	Dismenorrea

Beneficios para su paciente³

- Ejerce su **efecto ansiolítico** disminuyendo la actividad neuronal
- **Reduce** la secreción gástrica
- **Corrige los trastornos** de la motilidad del músculo liso visceral

SNS = Sistema Nervioso Simpático SNP = Sistema Nervioso Parasimpático



Ayuda Visual
Librax®
Valeant






PROTECCIÓN | minuto a minuto

- Ofrecen a usted y a sus pacientes:^{4,5}
 - Confianza
 - Seguridad y
 - Cumplimiento del tratamiento
- Ocasionalmente ocasionan un descenso de la TA sostenido^{4,5}
- Comprobada protección a órganos blanco¹⁴⁻⁸



- En el estudio ONTARGET Telmisartán demostró mejor tolerabilidad que Ramipril⁹
- Telmisartán + Hidroclorotiazida tienen un mejor perfil de seguridad que otros ARA II¹
- Cómoda posología, una sola toma al día^{14,5}

Tiempo después de la dosis (horas)



Cambio en la TA (mmHg) de basal (mmHg)

Tiempo después de la dosis (horas)



Cambio en la FC (b/min) de basal (b/min)

Medición de la reducción horaria promedio observada durante el día. Predicción simulada de Puntos Atrial (Sistema) y Tachicardia manifestada.

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

Ayuda Visual
Predxal®
Armstrong



INCIDENCIA DE LA HPB DE ACUERDO A LA EDAD

La HPB se presenta con la siguiente incidencia:

- de los 50 a 59 años de edad (20% de incidencia)
- de los 60 a 79 años de edad (32% de incidencia)
- y 80 años de edad (50% de incidencia)

ASOFLON[®]
simpatol 1 mg

TIENE SU LUGAR EN LA TERAPIA DE LA HPB

- ✓ Rápido inicio de acción de 4 a 8 horas en pacientes con sintomatología de moderada a severa *
- ✓ Los bloqueadores Alfa presentan la máxima mejoría a los tres meses de tratamiento consistente en un alivio de los síntomas de 30 a 45% *
- ✓ No es necesario con ASOFLON la titulación de dosis al inicio del tratamiento *
- ✓ Su administración de una sola toma al día favorece el apego al tratamiento *
- ✓ ASOFLON inhibe la estimulación simpática Alfa 1 promoviendo la relajación del músculo liso prostático y del cuello vesical *

TERLEP[®]
terlepe 1 mg

TIENE SU LUGAR EN LA TERAPIA DE LA HPB

- ✓ Inhibe a la enzima 5 alfa reductasa responsable de transformar a la testosterona en DHT el principal andrógeno responsable del crecimiento anormal de la próstata *
- ✓ Disminuye en 91.4% la DHT *
- ✓ Al reducir el volumen de la próstata se disminuye la obstrucción de la salida vesical *
- ✓ Se reduce el riesgo de la retención aguda de orina, así como el riesgo de cirugía *
- ✓ La reducción máxima de la próstata se alcanza a los 6 meses *
- ✓ El efecto de TERLEP es mayor en hombres con próstata muy grande (>25 mL) *

ASOFLON[®]

TERLEP[®]

Ayuda Visual
Asoflon[®] y Tealep[®]
Asofarma



Delisse®
G E L

La higiene de la mujer empieza en su intimidad

Indicado en vulvovaginitis producidas por bacterias, hongos o protozoarios

Porque alivia los síntomas característicos de la enfermedad:

**Flujo
Ardor
Prurito
Mal olor
Irritación**

La higiene de la mujer empieza en su intimidad


MODO DE USO

USO TERAPÉUTICO
Presentación en Gel Shampoo para aplicación vulvar.
Tratamiento inicial
2 aplicaciones al día.
Terapia de mantenimiento
1 vez al día.

USO PROFILÁCTICO
1 vez al día.

www.delisse.com.mx

Ayuda Visual
Delisse®
Corne



Geriatric
Pharmaton®

Pharmaton®
cápsulas

Recuperan la energía

Pharmaton®
Geriatric



Pharmaton® cápsulas

Recupera la energía física

Fórmula Original Suiza
De uso diario que combina de manera balanceada micronutrientes que actúan contra el desgaste metabólico

- Vitaminas ***
 - Efecto antioxidante
 - Participa en el metabolismo óseo
- Minerales y oligoelementos ***
 - Participan en diferentes procesos metabólicos
- Pharmaton® mejora la calidad de vida ***

Ginseng G115
extracto estandarizado exclusivo de Laboratorios Pharmaton Suiza

- Aumenta la **capacidad para el trabajo físico** por el aumento en la oxigenación muscular *
- **Disminuye la fatiga** en tratamientos continuos a partir de las 6 semanas *
- **Mejora el rendimiento** y la percepción subjetiva de fatiga durante la actividad mental sostenida *
- **Aumenta la vitalidad ***



Ayuda Visual
Pharmaton® cápsulas
Boehringer Ingelheim



Ayuda Visual
Pharmaton[®] kiddi
Boehringer Ingelheim



Ayudas Visuales
Pharmaton® Complex
Boehringer Ingelheim



MATERIAL CIENTÍFICO



Serie de Actualización Bibliográfica
Macrodantina®
Boehringer Ingelheim



SERIE BIBLIOGRÁFICA

Pharma
Compl

1

EFECTOS DEL DIMETILAMINOETAN
CONTRA LOS DÉFICITS DE MEMORIA
EVIDENCIA DE ESTUDIOS PRECLINIA
Siu C. et al. Effects of dimethylaminoethan
memory deficits induced by scopolamine. *Int
Psychopharmacology*. 2007; 207-207-12

SERIE BIBLIOGRÁFICA

Pharma
Compl

2

ACETILCOLINA EN MENTE: UN NE
CORRELACIONA CON LA CONCIEN
Perry E. et al. Acetylcholine in mind: a new
Trends Neurosci. 1994; 22(4): 270-86

SERIE BIBLIOGRÁFICA

Pharma
Compl

3

ANÁLISIS DE DENSIDAD DE FUENTE
MONITOREO DE LA ACCIÓN FARMAC
Dingfai W. et al. Source density analysis of
topical drug action. *Eur J Med Res*. 1994;

SERIE BIBLIOGRÁFICA

Pharma
Compl

4

EFECTO ESTIMULANTE DEL 2-DIM
EN VOLUNTARIOS SANOS
Murphy MB. et al. The stimulant effect of
muscimol in humans. *Clin Pharmacol Ther*

SERIE BIBLIOGRÁFICA

Pharma
Compl

5

EL GINSENG MEJORA LA FUNCIÓN
PARA HACER EJERCICIO EN PACIEN
Gross D. et al. Ginseng improves pulmonary
in patients with COPD. *Mandarin Arch Chest*

SERIE BIBLIOGRÁFICA

Pharmaton®
Complex

6

EFICACIA Y SEGURIDAD DEL GINSENG
Kito DG. et al. Efficacy and safety of Ginseng. *Public Health Nutr*. 2002; 5(4): 470-85

Serie Bibliográfica
Pharmaton® Complex
Boehringer Ingelheim



Serie Bibliográfica
Pharmaton® Matruelle
Boehringer Ingelheim

En la salud hay parámetros que deben bajar



Algo a de acuerdo con el resultado de tus análisis, te han diagnosticado Dislipidemia, es necesario que sigas tu tratamiento y las recomendaciones de tu Médico, y que periódicamente más cheques los niveles de Colesterol y Triglicéridos.

La **dislipidemia secundaria** es la que se asocia a otras enfermedades como la obesidad, la diabetes y el mal funcionamiento de la tiroidea. Dada la alta incidencia de dislipidemias en México, es muy importante que todas las personas mayores de 20 años y personas que hayan sufrido una enfermedad cardiovascular o tengan otros padecimientos, como hipertensión, obesidad o diabetes, se realicen estudios que determinen el nivel de Colesterol y Triglicéridos para poder controlarlos.

Características del Colesterol y los Triglicéridos

A las grasas en el organismo se les reconoce médicamente como lípidos y se clasifican en dos grandes grupos: Colesterol y Triglicéridos, éstos provienen de dos fuentes posibles:

En la salud hay parámetros que deben bajar



los llamados "órganos blanco": el corazón, el cerebro, el pulmón y los riñones, ocasionando graves daños, por ejemplo, enfermedades coronarias, accidentes vasculares cerebrales, etc.

El colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) es considerado como el "Colesterol Bueno". Las HDL llevan al colesterol de los vasos sanguíneos al hígado, donde el metabolismo lo elimina. A diferencia de lo que sucede con el LDL, los niveles elevados de HDL (80mg/dL o mayores) se consideran buenos porque suelen reducir los niveles de riesgo de las enfermedades cardiovasculares.

Los Triglicéridos son llevados por la sangre hasta los tejidos donde se pueden usar como fuente de energía o almacenarse en células grasas para su uso futuro. Una concentración elevada de Triglicéridos se convierte en una preocupación médica.

Muchas personas con Triglicéridos elevados también presentan LDL elevados y HDL bajas, lo cual en combinación parece ser la causa de que se incremente el riesgo cardiovascular.

Niveles Sanguíneos de HDL (Colesterol Bueno)

HDL alto	60 mg/dL o más
HDL bajo	40 mg/dL o menos


Triglicéridos

Recomendable	Menor de 100 mg/dL
Límite	de 100 a 150 mg/dL
Triglicéridos elevados	de 200 a 500 mg/dL
Triglicéridos muy elevados	500 mg/dL o mayores

Factores de riesgo reconocidos para enfermedades cardiovasculares

- El peso de tu cuerpo te hace ser un adulto o más.
- La familia tiene un historial de enfermedades cardiovasculares.
- La hipertensión arterial.
- El tabaquismo.
- El colesterol malo (LDL) por encima de 190 mg/dL.
- El azúcar en sangre (glucosa) por encima de 125 mg/dL.

DHL y **DT2**



¿Infección de Vías Urinarias?

Infecciones de Vías Urinarias

La importancia de la higiene

Siempre antes de ir al baño y después de ir al baño lavar bien las manos con agua y jabón. Evitar el uso de toallas húmedas y ropa interior húmeda.

Al usar el baño, evitar de la urgencia para ir al baño. No usar papel higiénico de colores ni perfumes. Evitar el uso de jabón de tocador.

Siempre usar ropa interior de algodón y evitar el uso de ropa interior sintética.

Siempre lavarse bien las manos con agua y jabón. Evitar el uso de toallas húmedas y ropa interior húmeda.

Siempre usar ropa interior de algodón y evitar el uso de ropa interior sintética.

¿Qué es una Infección de Vías Urinarias (IVU)?

Es el tipo de infección bacteriana más común que afecta al tracto urinario. La orina es el líquido que los riñones filtran del torrente sanguíneo. La orina contiene sales y productos de desecho, pero normalmente no contiene bacterias. La IVU se puede producir cuando las bacterias entran a la vejiga o al riñón y se multiplican en la orina.

Las infecciones usualmente son causadas por E. coli, las bacterias que se encuentran normalmente en el tubo digestivo y en la piel alrededor de las áreas del recto y de la vagina. La uretra es la estructura de tubo que permite que la orina salga del cuerpo desde la vejiga. Cuando las bacterias entran a la uretra, pueden avanzar hacia la vejiga y causar una infección.

Las mujeres son más propensas a desarrollar una infección urinaria que los hombres, debido a que las mujeres tienen la uretra más corta que los hombres y la abertura está más cerca del recto y la vagina, donde es más probable que se encuentren bacterias.

Los tipos comunes de infecciones de Vías Urinarias son:

Cistitis, la más común de las IVU, es una infección de la vejiga.

Uretritis, cuando las bacterias infectan la uretra.

Pielonefritis, una infección del riñón que puede ocurrir cuando la orina infectada fluye hacia atrás desde la vejiga a los riñones, o cuando una infección en la sangre llega a los riñones.



Los factores que favorecen las Recurrencias* pueden ser:

Estilo de vida

- Relaciones sexuales
- Uso del diafragma
- Uso de preservativos o espermicidas
- Uso reciente de antibióticos

Riñones

- Anomalías congénitas
- Obstrucción urinaria
- Diabetes mellitus
- Incontinencia urinaria
- Antecedentes de IVU

Otros

- Cirugía urinaria
- Deficiencia de estrógenos

*Se define RECURRENCIA como la aparición de 2 infecciones urinarias en los últimos 12 meses o 2 en los últimos 6 meses.

Los síntomas de infecciones en Vías Urinarias pueden incluir:

- Ardor o dolor al orinar
- Micción frecuente
- Sensación de tener que orinar aún cuando no existe orina en la vejiga
- Escalofríos
- Fiebre
- Dolor abdominal bajo
- Dolor en espalda baja o mal de espalda

Ante cualquiera de estos síntomas no se automedique, acuda de inmediato con su Médico para ser correctamente diagnosticado y tratado.

Literatura de Infección de Vías Urinarias
Grünenthal

PERSONAJES FAMOSOS
CON DEPRESIÓN



Abraham Lincoln
Escritor de los Estados Unidos

PERSONAJES FAMOSOS
CON DEPRESIÓN



Virginia Woolf
Escritora británica

PERSONAJES FAMOSOS
CON DEPRESIÓN



Claude Monet
Pintor francés

PERSONAJES FAMOSOS
CON DEPRESIÓN



Winston Churchill
Político británico

PERSONAJES FAMOSOS
CON DEPRESIÓN



Miguel Ángel Buzanoff
Pintor ruso

PERSONAJES FAMOSOS
CON DEPRESIÓN



Felipe V
Rey de España

Serie Fascicular
Lexapro®
Lundbeck

LÁMINA Nº 1 COLUCCIONABLE DE 19

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

LESIÓN POR LATIGAZO CERVICAL

Hiperextensión

Lesión en apófisis espinosa

Extensión del músculo esternocleidomastoideo

Lesiones en discos intervertebrales

Hiperflexión

Inflamación del nervio espinal

Lesión en disco intervertebral

Fractura de vértebra

DESCRIPCIÓN:
A diferencia de las lesiones de la parte anterior de la nuca, las de la columna cervical pueden comprometer la médula espinal. Las lesiones de traquéa, los discos intervertebrales y los vasos, son los responsables de la mayor parte de las lesiones de la nuca. Ocurren por alguna caída o un movimiento brusco, por accidente de tráfico que produce una caída o flexión excesiva, por un golpe o un resaca.

COMBIKAM

LÁMINA Nº 2 COLUCCIONABLE DE 19

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

ESCOLIOSIS

Brazos desalineados

Curvatura anormal

Desviación en disco y vértebra

Esclerosis con daño en vértebras dorsales

Esclerosis con daño en vértebras lumbares

Lesiones de ligamentos anfiblastos

DESCRIPCIÓN:
Las escoliosis no solo pueden consistir en torce de la región lumbar cuando el paciente permanece mucho tiempo sentado o de pie. A ello puede seguir deformación de la espalda, localizadas en las áreas de flexión, por ejemplo en el ángulo lumbosacro. Las escoliosis con escoliosis idiopática no degenerativa, lo que hace necesario un estudio más profundo. En estos casos, el tratamiento consiste en el tratamiento de la escoliosis.

COMBIKAM

LÁMINA Nº 3 COLUCCIONABLE DE 19

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

CIFOSIS DORSAL

Curvatura anormal

Boleal del trapecio

Boleal del deltoides

Boleal del dorsal

Boleal del dorsal

DESCRIPCIÓN:
Una del grupo Apfite, en una de las partes más importantes de la columna cervical con promotor de la columna cervical en un momento de la vida de más de 40 años. La lesión de la parte superior de la espalda, también se llama escoliosis.

COMBIKAM

LÁMINA Nº 4 COLUCCIONABLE DE 19

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

Articulación sana

Articulación inflamada

Sinoviocitos

Función sana en forma de capa de cartilago

Articulación sana

Espanditis anquilosante con daño en vértebras lumbares

DESCRIPCIÓN:
La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad inflamatoria crónica del esqueleto axial, que se caracteriza por la inflamación progresiva durante más de 3 meses, con rigidez con espasmos por noche al despertar. Otras características incluyen un inicio de la enfermedad en la columna lumbar y/o la sacroilíaca.

COMBIKAM

LÁMINA Nº 5 COLUCCIONABLE DE 19

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

ESGUINCE LUMBAR

Lesión en ligamento interespinal

Desgarro de músculo

LIGAMENTOS QUE SE PUEDEN LESIONAR EN UN ESGUINCE LUMBAR

LIGAMENTO INTERTRANSVERSARIO

LIGAMENTO LONGITUDINAL POSTERIOR

LIGAMENTO ANARILLO

DISCO INTERVERTEBRAL

LIGAMENTO LONGITUDINAL ANTERIOR

DESCRIPCIÓN:
El esguince lumbar es una lesión traumática que se produce al realizar una actividad física que requiere un movimiento brusco. Este movimiento puede ser una flexión o una extensión brusca de la columna lumbar, lo que provoca una lesión de los ligamentos que se encuentran en la zona lumbar.

COMBIKAM

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
FRACTURA DE COLUMNA

LÁMINA Nº 6 COLECCIÓN DE 10



Fractura en L1
Lesión en médula espinal
Lesión muscular


COLUMNA VERTEBRAL CON FRACTURA LUMBAR **LESIONES ASOCIADAS A FRACTURA LUMBAR**

DESCRIPCIÓN
La fractura más común de la columna cervical son las fracturas autoinmunitarias, seguidas por fracturas en sujetos jóvenes por deportes de riesgo. En la región cervicobraquial, las fracturas de la columna cervical son las más comunes. Las fracturas de la columna cervical se presentan en pacientes entre los 15 y 20 años y en segundo lugar en pacientes con más de 55 años.
Las fracturas por compresión vertebral (FCV) de la columna torácica son frecuentes en pacientes de tercera edad. Aproximadamente el 20% de las mujeres postmenopáusicas en EE. UU. presentan fracturas por compresión de la columna. La prevalencia de estas fracturas aumenta con la edad, alcanzando el 60% a los 80 años.
Aunque menos comunes que las fracturas de columna, las FCV pueden ocasionar lesiones físicas severas. La fractura de la columna cervical puede ocasionar lesiones neurológicas y discapacidad significativa. Las FCV de la columna lumbar pueden ocasionar una lesión progresiva.
Las fracturas de la columna lumbar pueden ocasionar una lesión más leve que las fracturas de la columna cervical, pero pueden ocasionar una lesión permanente si no se tratan adecuadamente con cirugía o rehabilitación.

KombiCART

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
OSTEOMIELITIS

LÁMINA Nº 7 COLECCIÓN DE 10




COLUMNA VERTEBRAL CON OSTEOMIELITIS

DESCRIPCIÓN
La osteomielitis es la inflamación de la columna vertebral. Se define como la infección por un organismo de la destrucción de la columna vertebral, que inicia a partir de la placa vertebral y puede afectar de manera secundaria a los discos intervertebrales.
El término osteomielitis significa infección primaria del disco intervertebral por algún patógeno, con infección secundaria de los cuerpos vertebrales adyacentes. El organismo del responsable, los cuerpos vertebrales en las fracturas vertebrales y en los discos intervertebrales por la gran cantidad de vasos en los discos.
El período promedio entre la infección primaria y el diagnóstico en la mayoría de los casos es de 2 a 4 meses. Este período varía a que con frecuencia los síntomas son débiles. Después de la infección del primer nivel, por lo general se produce una enfermedad diseminada de la columna vertebral.
El pronóstico de la osteomielitis es poco favorable antes de la administración de los antibióticos. Especialmente en aquellos casos de infección por el organismo de la osteomielitis de la columna vertebral, ya que la mortalidad puede ser del 2 al 17%.

KombiCART

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
LORDOSIS

LÁMINA Nº 8 COLECCIÓN DE 10



Con dolor en el cuello y hombros
Curvatura anormal
Lesión en disco y vértebra
Extensión de ligamento longitudinal anterior

COLUMNA CON LORDOSIS **LESIONES MUSCULARES**

DESCRIPCIÓN
La lordosis es la curvatura de la columna. Se trata de una flexión de la columna hacia atrás, que hace que la cabeza quede por encima de los hombros.
La lordosis es una curvatura de la columna que ocurre cuando el paciente se inclina hacia adelante, en un intento por mantener el equilibrio. En este caso, la cabeza se inclina hacia adelante y el cuello se inclina hacia atrás.
La lordosis es una alteración que puede ser una afección que se presenta como enfermedad congénita o adquirida. También es la respuesta típica a las enfermedades de la columna vertebral.

KombiCART

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
ESPONDILOLISIS Y ESPONDILOLISTESIS

LÁMINA Nº 9 COLECCIÓN DE 10



Fractura en L4
Desplazamiento de L4
Lesión en ligamento longitudinal anterior
Lesión en médula espinal
Lesión en ligamento interespinoso
Lesión muscular

COLUMNA CON ESPONDILOLISIS **COLUMNA CON ESPONDILOLISTESIS**

DESCRIPCIÓN
Son dos patologías que ocurren relacionadas entre sí. Afectan más frecuentemente a la parte baja de la espalda, sobre todo a nivel de la quinta vértebra lumbar y por menor frecuencia a la sexta.
Pueden afectar la estabilidad como un mecanismo de defensa de la columna que evita el desplazamiento de la columna vertebral.
La espondilolisis consiste en un desplazamiento de una vértebra sobre otra, hacia atrás provocado por una espondilolisis.
Según se describe la relación entre la espondilolisis y la espondilolistesis, se trata de una "espondilolisis" o "espondilolistesis".
Se puede observar en ambos grados en función del desplazamiento, desde el cuarto grado el más grave.
Señales: En muchos casos se presentan síntomas, usualmente de una forma crónica y de carácter intermitente. Pueden tener una evolución progresiva y en los grados más altos de inestabilidad pueden llegar a provocar lesiones neurológicas.

KombiCART

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
FRACTURA DE SACRO

LÁMINA Nº 10 COLECCIÓN DE 10



1 Zona 1: Región del ala
2 Zona 2: Región del sacro lateral
3 Zona 3: Región del canal central

CLASIFICACIÓN DE DENIS DEL HUESO SACRO EN TRES ZONAS **FRACTURA SACROCCÍGICA**

DESCRIPCIÓN
El hueso sacro humano es una parte importante de la estructura ósea de la columna vertebral y es el hueso más grande de la columna. Se trata de un hueso que se encuentra en la parte inferior de la columna vertebral y que se compone de cinco vértebras sacrales fusionadas.
El hueso sacro se divide en tres zonas: la zona superior, la zona media y la zona inferior. La zona superior es la parte superior del hueso sacro y se compone de las vértebras sacrales L1, L2 y L3. La zona media es la parte central del hueso sacro y se compone de las vértebras sacrales L4, L5 y S1. La zona inferior es la parte inferior del hueso sacro y se compone de las vértebras sacrales S2, S3, S4 y S5.
Las fracturas del hueso sacro se clasifican en tres zonas: la zona superior, la zona media y la zona inferior. La zona superior es la parte superior del hueso sacro y se compone de las vértebras sacrales L1, L2 y L3. La zona media es la parte central del hueso sacro y se compone de las vértebras sacrales L4, L5 y S1. La zona inferior es la parte inferior del hueso sacro y se compone de las vértebras sacrales S2, S3, S4 y S5.

KombiCART

Colección de Láminas 6 a 10
Kombicam®
Interlab

Conjuntivitis Papilar Gigante

Producese principalmente por contacto del lente, lentes



Alergia de Contacto

Una alergia que generalmente se produce al usar




Queratoconjuntivitis Atópica

Es una enfermedad que se relaciona con la rinitis



Queratoconjuntivitis Vernal

Es una enfermedad de forma estacional y de verano



Conjuntivitis Alérgica Estacional y Perenne

Es una enfermedad que se produce por la granja de



Causas de Conjuntivitis Alérgica

La conjuntivitis alérgica estacional y la perenne, son causadas por una reacción causada por insectos, mofetas, el cigito y alérgenos presentes en el medio ambiente, tales como polvo, polen de árbol, hongos, insectos y caca de animal.



El síndrome de conjuntivitis alérgica se refiere a una serie de reacciones de hipersensibilidad que afectan al ojo. La conjuntivitis es la inflamación de la membrana que cubre el ojo. Se clasifica en dos tipos de alergia: estacional y perenne. El primer grupo incluye a las conjuntivitis alérgicas más frecuentes, la estacional y la perenne, que también se conocen como conjuntivitis alérgica. El segundo grupo incluye formas crónicas severas como Queratoconjuntivitis alérgica vernal, las queratoconjuntivitis atópica y atópica.



Con algunas y algunas reacciones como: picazón, enrojecimiento y hinchazón del ojo, siempre también pueden aparecer opacidades, secreciones mucosas y sensación de opresión.

Referencia: [www.who.int/mediadata/figuresandfactbooks/diseasesandconditions/allergy/allergy.html](#)

Colección de Láminas Lastacraft® Allergan



MANUALES de CAPACITACIÓN




Manuales de Línea Cardiovascular
Abbott



Manuales de entrenamiento
Abbott



Logotipos



Predxal[®]
Telmisartán

Predxal[®] *plus*
Telmisartán + Hidroclorotiazida

RADIOCARE[®]

Predxal[®], Predxal[®] plus, Radiocare[®]
Armstrong

Bona
OMBRA

bonaderm[®]

Bon**Soleil**

Bona **Silk**[®]

Bona Ombra, Bonaderm, BonSoleil y BonaSilk[®]
Bonapharma



MATERIAL PARA PRODUCTOS OTC



Diseño de etiquetas
Bonaderm
Bonapharma



Diseño de etiquetas
BonaSilk®
Bonapharma




Diseño de etiquetas y envase
BonSoleil / Bona Ombra
Bonapharma





MATERIAL CORPORATIVO INTERNO

ADVANCING



LATAM

Boletín Bimestral Regional

Marzo 2015



INGRESOS

Brasil	Colombia
<p>MARCO ANTONIO Director Regional Unidad de Negocios</p> <p>MARCELO BRIND Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p>	<p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p>

Compartiendo en Brasil



Este año ha comenzado, y con él nuestra Convención de Ventas, que se celebró en Guarujá, São Paulo, del 26 al 30 de enero.

El tema de motivación "Juntos Podemos Más" mantuvo al equipo alegre, relajado y totalmente comprometido en las sesiones. Como símbolo, hubo tres superhéroe que representaron a las tres líneas de productos de Brasil (Previdex, Dispositivos y MMS) y que simbolizan "Lo unido hace la fuerza". Finalmente, las cosas salen mejor cuando todos están unidos por un mismo objetivo.

El programa de la convención incluyó una jornada de formación conceptual "Ventas de Alto Impacto", impartido por Peter Switzer y Barbara Lanzetta, además de la presentación de los resultados del año, estrategias de marketing, nuevos materiales de promoción, sesiones médicas y mucha capacitación.

Previamente a la jornada de "10 Mitos de la Salud". El evento fue un gran momento para la diversión y el aprendizaje para el equipo de ventas.

Además de la capacitación, hubo una sesión de formación de equipos. En la tarde del penúltimo día de la reunión, el equipo disfrutó de un paseo en bote por la playa de la isla.

La reunión terminó con una cena, premios, promociones y un espectáculo con una banda de música en vivo.

Durante esa semana, nuestro equipo disfrutó momentos de aprendizaje, reciclaje, mucho conocimiento y unidad.

JUNTOS PODEMOS MÁS

Convención Anual de Ventas 2015

El 13 de febrero en Valle de Bravo, Estado de México, tuvimos nuestra Convención Anual de Ventas en donde revisamos la estrategia para lograr los objetivos del 2015, tanto para Previdex como para MMS.

Estoy entusiasmado por tener nuevamente disponibles los Planes A+ para aumentar nuestra base instalada.

Con respecto a lo anterior, durante este año estamos sustituyendo la tecnología LCS30 por Plum A+, lo cual fortalecerá nuestra penetración en el mercado, aumentando la satisfacción de nuestros clientes. Por otro lado, estamos lanzando Supplier para mitad del año.

Por eso, esta oportunidad para certificar nuestros canales en temas de inclusión y atención. También realizamos actualización de nuestro entrenamiento en políticas de atención con profesionales de la salud.



Kick Off Meeting 2015

Me es grato compartirles que del 10 al 13 marzo 2015 se llevó a cabo en la Ciudad de México la reunión del Equipo de Distribuidores para América Latina y el Caribe con participación de los líderes de negocio Regionales como: Recursos Humanos, Calidad, Asesoría Regulatoria, Marketing y Servicio al Cliente. Es de la importancia y prioridad de desarrollo de negocios en nuestros países distribuidores a través de diferentes entornos de mercado, el objetivo de esta reunión fue definir las prioridades en actividades que impulsarán nuestro enfoque en los resultados, siendo un punto importante en la agenda el taller de discusión y definición de funcionalidades de los Gerentes de Cuentas quienes en la consecutiva deberán gestionar las oportunidades e implementación de estrategias.

Apoyando para compartirles que nuestros resultados del 1Q 2015 han sido favorables y reiterar nuestro compromiso para continuar trabajando en la mitigación de riesgos de mercado, teniendo como principal entre la inestabilidad de mercado como Venezuela.




En nombre de mi equipo, agradezco la participación, apoyo y compromiso de los áreas funcionales para hacer que nuestros negocios sigan avanzando más rápido.

Atentamente,

Alexander Rebelatto
Regional Director CR
Hospira Latin America



Chile	Perú
<p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p>	<p>JOSÉ ALEJANDRO Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p> <p>IVAN GONZALEZ Representante de Ventas M</p>



Diseño e impresión en papel aperlado de diplomas
Hospira



Diseño de certificados y gafetes para evento
Training Meeting DX Team
Hospira

SOMOS.
TU MEJOR
dosis de
publicidad